



Devoir non surveillé 8 - Correction

Problème

Endomorphismes échangeurs

D'après un corrigé de C. Devulder

Les questions préliminaires ont été ajoutées, elles ne figuraient pas dans l'énoncé. Ce sont des questions de cours qui permettaient d'éviter certaines confusions.

A. Quelques considérations en dimension 2

1. La trace est linéaire et donc pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, $\text{Tr}(-u) = -\text{Tr}(u)$.

Si u vérifie **(C3)** alors il existe un automorphisme φ de E tel que $-u = \varphi \circ u \circ \varphi^{-1}$ et donc

$$\text{Tr}(-u) = -\text{Tr}(u) = \text{Tr}(\varphi \circ u \circ \varphi^{-1}) = \text{Tr}(\varphi^{-1} \circ (\varphi \circ u)) = \text{Tr}(u)$$

et la trace de u est donc nulle.

$$\boxed{\text{Si } u \text{ vérifie (C3) alors } \text{Tr}(u) = 0}$$

2. **Méthode 1 :** Puisque la trace de u est nulle, la matrice de u dans une base \mathcal{B} de E est de la forme :

$$M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & -a \end{pmatrix}.$$

$$\text{Et donc, } M \times M = M^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & 0 \\ 0 & a^2 + bc \end{pmatrix} = (a^2 + bc)I_2 = -\det(M)I_2.$$

$$\text{Par conséquent, } \boxed{u^2 = -\det(u)I_E = \delta^2 I_E.}$$

Méthode 2 : E étant de dimension 2, $\chi_u = X^2 - \text{Tr}(u)X + \det(u) = X^2 - \delta^2$. Ce polynôme annulant u (Cayley-Hamilton) on en déduit que $u^2 = \delta^2 \text{Id}_E$.

Le spectre est l'ensemble des racines de $\chi_u = \chi_M$ et vaut ici $\{\delta, -\delta\}$.

On a deux valeurs propres en dimension 2 et comme les sous-espaces propres sont en somme directe, il ne peuvent qu'être de dimension 1.

$$\boxed{u^2 = \delta^2 \text{Id}_E, \text{Sp}(u) = \{\delta, -\delta\}, \dim(E_\delta(u)) = \dim(E_{-\delta}(u)) = 1}$$

3. Notons e_+ un vecteur propre pour δ et e_- un vecteur propre pour $-\delta$. Ces vecteurs sont indépendants et on a

$$u(e_+ + e_-) = \delta(e_+ - e_-)$$

$D = \text{Vect}(e_+ + e_-)$ est une droite (car $e_+ + e_- \neq 0$) et elle n'est pas stable par u (car $\delta \neq 0$ et $(e_+ + e_-, e_+ - e_-)$ est libre car (e_+, e_-) l'est). On a donc $u(D) \not\subset D$.

Posons $F = D$ et $G = u(D)$. Ce sont des droites (car u est inversible et conserve la dimension) non égales et donc en somme directe (intersection réduite à $\{0\}$). Par dimension, ce sont des supplémentaires de E . Par définition, $u(F) = G$. De plus $u(G) = u^2(F) = \delta^2 F = F$. Ainsi,

$$\boxed{u \text{ est échangeur}}$$

B. La condition (C1) implique (C2) et (C3)

4. Un calcul par blocs montre que

$$\begin{pmatrix} 0_n & B \\ 0_{p,n} & 0_p \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0_n & 0_{n,p} \\ 0_{p,n} & 0_p \end{pmatrix} = 0_{n+p}$$

On montre de même que

$$\begin{pmatrix} 0_n & 0_{n,p} \\ A & 0_p \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0_n & 0_{n,p} \\ 0_{p,n} & 0_p \end{pmatrix} = 0_{n+p}$$

$$M = \begin{pmatrix} 0_n & 0_{n,p} \\ A & 0_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0_n & B \\ 0_{p,n} & 0_p \end{pmatrix} \text{ est somme de deux matrices de carré nul}$$

5. On vérifie par un calcul par blocs, par exemple, que

$$D^2 = I_n$$

D est donc inversible et est son propre inverse. Le calcul par blocs donne aussi

$$DMD^{-1} = DMD = \begin{pmatrix} 0_n & B \\ -A & 0_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0_{n,p} \\ 0_{p,n} & -I_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_n & -B \\ -A & 0_p \end{pmatrix} = -M$$

Par définition de la similitude,

$$M \text{ et } -M \text{ sont semblables}$$

6. $u(F) \subset G$ indique qu'il y a un bloc de 0 en haut à gauche.

$u(G) \subset F$ indique qu'il y a un bloc de 0 en bas à droite.

Finalement

$$\exists A, B / \text{Mat}_B(u) = \begin{pmatrix} 0_n & B \\ A & 0_p \end{pmatrix}$$

7. Si F et G sont non nuls, la question 4 montre que u vérifie (C2) en utilisant l'isomorphisme entre endomorphisme et matrice associée dans la base B . La question 5 montre de même que u et $-u$ sont semblables.

Si F est nul, alors $G = E$ et $\text{Im}(u) = u(G) \subset F = \{0\}$. u est l'endomorphisme nul qui vérifie immédiatement (C2) et (C3). C'est la même chose si $G = \{0\}$ (travailler alors avec $F = E$).

$$u \text{ vérifie (C2) et (C3)}$$

C. La condition (C2) implique (C1) : cas d'un automorphisme

8. Si $x \in \text{Im}(f)$, il existe y tel que $x = f(y)$ et donc $f(x) = f^2(y) = 0$. Ainsi $x \in \text{ker}(f)$. On a donc $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$ et par suite $\dim(\text{Im}(f)) \leq \dim(\text{Ker}(f))$.

Par théorème du rang,

$$\dim(E) = \dim(\text{ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) \leq 2 \dim(\text{ker}(f))$$

On a donc

$$\text{Im}(f) \subset \text{ker}(f) \text{ et } \dim(\text{ker}(f)) \geq \frac{\dim(E)}{2}$$

9. Soit $x \in \ker(a) \cap \ker(b)$. On a $u(x) = a(x) + b(x) = 0$ et comme u est injective $x = 0$.

Ceci montre que la somme $\ker(a) + \ker(b)$ est directe.

Soit $x \in E$; on a $x = u(u^{-1}(x)) = a(u^{-1}(x)) + b(u^{-1}(x)) \in \text{Im}(a) + \text{Im}(b)$. Or $\text{Im}(a) \subset \ker(a)$ (car $a^2 = 0$) et $\text{Im}(b) \subset \ker(b)$ (car $b^2 = 0$), donc $x \in \ker(a) + \ker(b)$.

Finalement

$$E = \ker(a) \oplus \ker(b)$$

De plus, $\text{Im}(a) \subset \ker(a)$ et $\text{Im}(b) \subset \ker(b)$. $\ker(a) \cap \ker(b) = \{0\}$ entraîne ainsi $\text{Im}(a) \cap \text{Im}(b) = \{0\}$ et donc la somme $\text{Im}(a) + \text{Im}(b)$ est directe.

Mais on a aussi $\forall x \in E$, $x = u(u^{-1}(x)) = a(u^{-1}(x)) + b(u^{-1}(x)) \in \text{Im}(a) + \text{Im}(b)$ et donc $E = \text{Im}(a) + \text{Im}(b)$ et finalement $E = \text{Im}(a) \oplus \text{Im}(b)$.

Si l'une des inclusions $\text{Im}(a) \subset \ker(a)$ ou $\text{Im}(b) \subset \ker(b)$ était stricte, on aurait

$$\dim(E) = \dim(\text{Im}(a)) + \dim(\text{Im}(b)) < \dim(\ker(a)) + \dim(\ker(b)) = \dim(E)$$

ce qui est une contradiction. Les inclusions sont donc des égalités.

$$\text{Im}(a) = \ker(a) \text{ et } \text{Im}(b) = \ker(b)$$

10. On a $u(\ker(a)) \subset a(\ker(a)) + b(\ker(a)) = b(\ker(a)) \subset \text{Im}(b) = \ker(b)$ et de même $u(\ker(b)) \subset \ker(a)$. Comme $\ker(a)$ et $\ker(b)$ sont supplémentaires,

$$u \text{ est échangeur}$$

D. Intermède : un principe de décomposition

11. Soit $k \in \mathbb{N}$. Si $x \in \ker(v^k)$ alors $v^{k+1}(x) = v(v^k(x)) = v(0) = 0$ et donc $x \in \ker(v^{k+1})$.

Ainsi $\ker(v^k) \subset \ker(v^{k+1})$ et $(\ker(v^k))_{k \in \mathbb{N}}$ croît pour l'inclusion

12. La suite de terme général $d_k = \dim(\ker(v^k))$ est donc aussi croissante. Or, elle est majorée (par $\dim(E)$). Elle est donc convergente.

Comme elle est constituée d'entiers, elle finit par stationner (puisque pour des indices grands, deux termes consécutifs de la suite sont des entiers distants de moins de $1/2$). En notant p le rang à partir duquel la suite stationne, on peut conclure que

$$\exists p \in \mathbb{N} / \forall k \geq p, \ker(v^k) = \ker(v^p)$$

Comme les noyaux sont emboîtés, on a $\bigcup_{k \leq p} \ker(v^k) = \ker(v^p)$. L'intersection avec les noyaux suivants ne change alors rien puisque ceux-ci sont égaux à $\ker(v^p)$.

$$\ker(v^p) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \ker(v^k)$$

Si p convient, tout entier plus grand que p convient aussi et on peut supposer p pair quitte à le changer en $p + 1$.

13. Les noyaux étant emboîtés, $E_\lambda^c(f) = \ker(v^p) \subset \ker(v^{2p})$. Mais $\ker(v^{2p})$ est aussi inclus dans l'intersection des $\ker(v^k)$ pour $k \geq p$ et donc a fortiori dans $\ker(v^p)$. Ainsi,

$$E_\lambda^c(f) = \ker(v^{2p})$$

Soit $x \in E_\lambda^c(f) \cap \text{Im}(v^p)$. Il existe y tel que $x = v^p(y)$ et $v^{2p}(y) = v^p(x) = 0$ montre que $y \in \ker(v^{2p}) = \ker(v^p)$ et donc que $x = v^p(y) = 0$. On a donc $E_\lambda^c(f) \oplus \text{Im}(v^p)$.

Par théorème du rang, les sommes des dimensions de $E_\lambda^c(f) = \ker(v^p)$ et $\text{Im}(v^p)$ vaut $\dim(E)$. La somme précédente est donc égale à E et nos espaces sont supplémentaires dans E .

Si $x \in \text{Im}(v^p)$, x s'écrit $x = v^p(y)$ et $v(x) = v^p(v(y)) \in \text{Im}(v^p)$.

Si $x \in \ker(v^p)$ alors $v^p(v(x)) = v(v^p(x)) = v(0) = 0$ et donc $v(x) \in \ker(v^p)$.

$$\boxed{E_\lambda^c(f) \text{ et } \text{Im}(v^p) \text{ sont des supplémentaires de } E \text{ stables par } f.}$$

14. Supposons, par l'absurde, que λ soit valeur propre de $f|_{\text{Im}(v^p)}$. Il existe alors $x \in \text{Im}(v^p)$ non nul tel que $f(x) = \lambda x$ c'est à dire tel que $x \in \ker(v) \subset E_\lambda^c$. Comme $E_\lambda^c(f)$ et $\text{Im}(v^p)$ sont en somme directe, $x = 0$ et ceci est contradictoire.

$(X - \lambda)^p$ annule $f|_{E_\lambda^c(f)}$ (par définition de $E_\lambda^c(f)$). La seule valeur propre possible pour $f|_{E_\lambda^c(f)}$ est donc λ .

$$\boxed{\lambda \notin \text{Sp}(f|_{\text{Im}(v^p)}) \text{ et } \text{Sp}(f|_{E_\lambda^c(f)}) \subset \{\lambda\}}$$

Si $E_\lambda^c(f)$ n'est pas réduit à $\{0\}$ (ce qui revient à dire que λ est valeur propre de f), l'inclusion est une égalité (par exemple car dans un \mathbb{C} espace de dimension ≥ 1 tout endomorphisme a au moins une valeur propre).

15. Les seules valeurs propres possibles de f sont λ et μ . Comme on est dans un \mathbb{C} -espace, il existe des entiers q et r tels que

$$\chi_f = (X - \lambda)^q (X - \mu)^r$$

q et r peuvent être nuls si λ ou μ n'est pas valeur propre mais $q + r = \dim(E)$.

Notons $g = f|_{\text{Im}(v^p)}$. Un polynôme annulant f annule g et le théorème de Cayley-Hamilton indique que

$$(g - \lambda \text{Id})^p \circ (g - \mu \text{Id})^r = 0$$

La question précédente indique que $(g - \lambda \text{Id})^p$ est inversible (car λ n'est pas valeur propre de g) et en composant par l'inverse, on a donc

$$(g - \mu \text{Id})^r = 0$$

En particulier, $\forall x \in \text{Im}(v^p)$, $x \in \ker((g - \mu \text{Id})^r) \subset \ker((f - \mu \text{Id})^r) \subset E_\mu^c(f)$.

Avec le résultat de la question 13, on a donc

$$E \subset E_\lambda^c(f) + E_\mu^c(f)$$

Par ailleurs, dans une base adaptée à la décomposition $E = E_\lambda^c(f) \oplus \text{Im}(v^p)$, la matrice de f est bloc-diagonale d'après la question 13. De plus, la question 14 indique qu'un bloc n'admet que λ comme valeur propre et l'autre n'admet que μ comme valeur propre. Le polynôme caractéristique du premier bloc est $(X - \lambda)^{\dim(E_\lambda^c(f))}$ et celui du second est $(X - \mu)^{\dim(\text{Im}(v^p))}$. Comme le produit de ces polynômes donne χ_f , on a $\dim(E_\lambda^c(f)) = q$. De même, on a $\dim(E_\mu^c(f)) = r$.

Ainsi, $E = E_\lambda^c(f) + E_\mu^c(f)$ et les dimensions sont les bonnes (la dimension de E est la somme des dimensions des deux autres espaces). On conclut que

$$\boxed{E = E_\lambda^c(f) \oplus E_\mu^c(f)}$$

E. La condition (C2) implique (C1) : cas non bijectif

16. $u^2 = a^2 + a \circ b + b \circ a + b^2 = a \circ b + b \circ a$. Ainsi

$$a \circ u^2 = a^2 \circ b + a \circ b \circ a = a \circ b \circ a = a \circ b \circ a + b \circ a^2 = u^2 \circ a$$

On procède de même avec $u^2 \circ b$.

$$\boxed{a \circ u^2 = u^2 \circ a \text{ et } b \circ u^2 = u^2 \circ b}$$

17. Comme a commute avec u^2 , il commute avec toutes les itérées de u^2 et donc avec u^p puisque p est pair. Ainsi, si $x \in \text{Im}(u^p)$, il existe y tel que $x = u^p(y)$ et $a(x) = a \circ u^p(y) = u^p \circ a(y) \in \text{Im}(u^p)$. $\text{Im}(u^p)$ est donc stable par a et de même il est stable par b .

a_G et b_G sont ainsi des endomorphismes de G et $a_G^2 = (a^2)_G = 0$ (idem pour b).

$$\boxed{a_G^2 = b_G^2 = 0}$$

18. Notons $F = E_0^c(u)$. F et G sont stable par u , et la restriction u_F de u à F est nilpotente (0 est la seule valeur propre avec la question 14) et la restriction u_G de u à F est inversible (0 n'est pas seule valeur propre avec la question 14).

D'après le résultat admis, il existe une décomposition $F = F_1 \oplus F_2$ telle que $u(F_1) \subset F_2$ et $u(F_2) \subset F_1$.

Avec la question précédente, u_G vérifie (C2) et comme c'est un automorphisme, la partie C s'applique. Il existe une décomposition $G = G_1 \oplus G_2$ telle que $u(G_1) \subset G_2$ et $u(G_2) \subset G_1$.

En posant $H_1 = F_1 \oplus G_1$ et $H_2 = F_2 \oplus G_2$ (le caractère direct des somme découle de $F \oplus G$), on a alors $E = H_1 \oplus H_2$ (on décompose sur F et G et on décompose chaque composante) et $u(H_1) \subset H_2$, $u(H_2) \subset H_1$. Ainsi

$$\boxed{u \text{ est échangeur}}$$

F. La condition (C3) implique (C1)

19. Composons l'identité $-u = \varphi \circ u \circ \varphi^{-1}$ à droite par φ^{-1} et à gauche par φ . On obtient

$$u = -\varphi \circ u \circ \varphi^{-1} = \varphi^2 \circ u \circ \varphi^{-2}$$

On en déduit en composant à droite par φ^2 que

$$\boxed{\varphi^2 \circ u = u \circ \varphi^2}$$

20. Comme on est dans un \mathbb{C} -espace, φ^2 possède une valeur propre λ . La question 13 donne $E = E_\lambda^c(\varphi^2) \oplus \text{Im}(v^p)$ (où $v = \varphi^2 - \lambda I_E$ et pour un bon entier p). $F = E_\lambda^c(\varphi^2)$ et $G = \text{Im}(v^p)$ sont des supplémentaires de E stables par φ^2 .

Soit $x \in F$; on a $\varphi^{2p}(x) = 0$ et comme u commute avec φ^2 , $\varphi^{2p}(u(x)) = u(\varphi^{2p}(x)) = 0$. Ainsi, F est stable par u .

Soit $x \in G$; on a l'existence de y tel que $v^p(y) = x$. Comme u et $v = \varphi^2 - \lambda I_E$ commutent, on a $u(x) = v^p(u(y)) \in G$ et G est stable par u .

On a vu que $\varphi^2 \circ u \circ \varphi^{-2} = u$ et comme F et G sont stables par tous les endomorphismes mis en jeu, cette relation reste vraie pour les endomorphismes induit sur F et G . L'indécomposabilité de u indique que F ou G est nul et comme F ne l'est pas, c'est que G l'est et que $F = E$. Ainsi, φ^2 est annulé par $(X - \lambda)^p$ et ne possède que λ comme valeur propre.

Si μ est valeur propre de φ et x vecteur propre associé alors $\varphi(x) = \alpha x$ et donc $\varphi^2(x) = \alpha^2 x$ et donc $\alpha^2 = \lambda$.

$$\boxed{\text{Sp}(\varphi) \subset \{\alpha, -\alpha\} \text{ avec } \alpha^2 = \lambda \text{ unique valeur propre de } \varphi^2}$$

21. φ admettant au plus deux valeurs propres, on peut lui appliquer la question 15 et obtenir

$$E = E_{\alpha}^c(\varphi) \oplus E_{-\alpha}^c(\varphi)$$

Notons que l'hypothèse **(C3)** donne $-u \circ \varphi = \varphi \circ u$ et donc

$$\forall x, (\varphi - \alpha I_E)(u(x)) = -(\varphi + \alpha I_E)(u(x))$$

puis par récurrence assez simple (en particulier car $\varphi - \alpha I_E$ et $\varphi + \alpha I_E$ commutent)

$$\forall x, (\varphi - \alpha I_E)^k(u(x)) = (-1)^k(\varphi + \alpha I_E)^k(u(x))$$

Soit $x \in E_{\alpha}^c(\varphi)$, c'est à dire que $(\varphi - \alpha I_E)^p(x) = 0$. On a alors $(\varphi + \alpha I_E)^p(u(x)) = 0$ et donc $u(x) \in E_{-\alpha}^c(\varphi)$. Ainsi $u(E_{\alpha}^c(\varphi)) \subset E_{-\alpha}^c(\varphi)$ et de même $u(E_{-\alpha}^c(\varphi)) \subset E_{\alpha}^c(\varphi)$. En conclusion,

u est échangeur

22. On procède par récurrence sur la dimension de l'espace.

- Initialisation : on suppose que u est un endomorphisme d'un espace de dimension 1 qui vérifie **(C3)**. Comme l'espace est de dimension 1, u est indécomposable et la question précédente montre qu'il est échangeur.
- Hérédité : supposons le résultat vrai jusqu'au rang n . Soit u un endomorphisme d'un espace E de dimension $n + 1$ et qui vérifie **(C3)**.

Si u est indécomposable, il est échangeur avec ce qui précède.

Sinon, il existe une décomposition $E = F \oplus G$ avec F et G non nuls stables par u et tels que u_F et u_G vérifient **(C3)**. L'hypothèse de récurrence s'applique à u_F et u_G et permet de décomposer F et G . Comme en question 18, on en déduit une décomposition de E qui montre que u est échangeur.

(C3) implique **(C1)**