Devoir non surveillé 21

à rendre le vendredi 21 mars

Problème

Dans tout le problème, I est l'intervalle $[1; +\infty[$.

On note $\mathcal{E}$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions continues et bornées sur I à valeurs réelles, et $\mathcal{E}_1 = \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de fonctions de classe C^1 sur I à valeurs réelles.

Lorsque V est un endomorphisme de $\mathcal{E}$, on rappelle que $V^0 = \text{Id}_{\mathcal{E}}$ et que si n est un entier naturel non nul, $V^n = \underbrace{V \circ \dots \circ V}_n$.

Soit a un **réel strictement positif**.

Pour tout f de $\mathcal{E}$, on considère l'équation différentielle sur I :

$$y' - ay + f = 0 \quad (E_a^f)$$

et on note $\mathcal{S}_a^f$ l'ensemble de ses solutions sur I .

Partie 1

1. Étude de l'équation (E_a^f) .

(a) Soient $f \in \mathcal{E}$ et $z \in \mathcal{E}_1$.

Montrer que z est solution de (E_a^f) si et seulement s'il existe $K \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in I, \quad z(x) = e^{ax} \left(K - \int_1^x e^{-at} f(t) dt \right)$$

(b) Prouver que s'il existe une solution de (E_a^f) qui soit bornée sur I , alors celle-ci est unique.

(c) Vérifier que l'intégrale $\int_1^{+\infty} e^{-at} f(t) dt$ est convergente.

(d) Montrer que la fonction $F : x \in I \mapsto e^{ax} \int_x^{+\infty} e^{-at} f(t) dt$ est l'unique solution de (E_a^f) bornée sur I .

On définit ainsi une application U_a de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{E}$ qui à toute fonction f de $\mathcal{E}$ associe la fonction $F = U_a(f)$ ainsi obtenue.

2. Étude de quelques propriétés de U_a .

(a) Expliciter $U_a(f)$ lorsque f est la fonction constante égale à 1.

(b) Vérifier que U_a est un endomorphisme de $\mathcal{E}$.

(c) i. L'endomorphisme U_a est-il injectif?

ii. Montrer que pour tout f élément de $\mathcal{E}$, $U_a(f) \in \mathcal{E}_1$.

iii. L'endomorphisme U_a est-il surjectif?

(d) **On suppose dans cette question et uniquement dans cette question que $a = 1$.**

Montrer que le sous-espace de $\mathcal{E} : \mathcal{F} = \text{Vect}(\sin, \cos)$ est stable par U_1 . En donner une base $\mathcal{B}$.

Écrire la matrice M de la restriction de U_1 à $\mathcal{F}$ dans cette base.

Prouver que $M = l\Omega$ où l est un réel positif et Ω une matrice de rotation dont on déterminera l'angle.

3. On revient au cas général.

- (a) Pour $r \in [0; +\infty[$, on note f_r la fonction de $\mathcal{E}$ définie par : $x \mapsto e^{-rx}$.
Déterminer $U_a(f_r)$.
- (b) Soit $l \in \left]0; \frac{1}{a}\right]$. Le réel l est-il valeur propre de l'endomorphisme U_a ?
- (c) Étudier la convergence simple de la suite de fonctions $(U_a^n(f_r))_{n \in \mathbb{N}}$ sur I .
- (d) Étudier la convergence simple de la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} U_a^n(f_r)$ sur I et déterminer sa somme lorsqu'elle converge.

4. Prouver que l'on a, pour tout élément f de $\mathcal{E}$:

$$\forall x \in I, \quad U_a(f)(x) = \int_0^{+\infty} e^{-at} f(x+t) dt$$

5. Pour tout entier naturel k , on note g_k la fonction de $\mathcal{E}$ définie par : $g_k(x) = e^{-x} x^k$ et on note $G_k = U_a(g_k)$.
Pour tout entier naturel p , on note $\mathcal{F}_p = \text{Vect}(g_0, \dots, g_p)$.

- (a) Donner une base $\mathcal{B}_p$ de $\mathcal{F}_p$.
- (b) Vérifier que $\mathcal{F}_p$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{E}$ stable par U_a .
- (c) Calculer le déterminant de la restriction de U_a à $\mathcal{F}_p$.

6. Prouver que l'on a : $\forall f \in \mathcal{E}, |U_a(f)| \leq U_a(|f|)$.

7. Soit f dans $\mathcal{E}$ à valeurs positives. En est-il de même pour $U_a(f)$?

8. Soit f dans $\mathcal{E}$ décroissante. Prouver que $aU_a(f) \leq f$ puis que $U_a(f)$ est décroissante.

9. On note :

- (a) $\mathcal{H}$ l'ensemble des éléments de $\mathcal{E}$ de classe C^1 sur I et tels que f' est bornée sur I .
- (b) D l'opérateur de dérivation sur $\mathcal{H}$.

Soit $f \in \mathcal{H}$.

- (a) Montrer que l'on a : $U_a(f') - aU_a(f) + f = 0$.
- (b) En déduire que U_a et D commutent dans $\mathcal{H}$.

10. Soit $f \in \mathcal{E}$.

Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_a^{n+1}(f)$ est la fonction $x \mapsto e^{ax} \int_x^{+\infty} \frac{(t-x)^n}{n!} e^{-at} f(t) dt$.

On pourra procéder par intégration par parties.

11. Soit $f \in \mathcal{E}$. On suppose dans cette question et uniquement dans cette question que $a > 1$.

(a) Soient $x \in I$ et t un réel supérieur ou égal à x . Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{(t-x)^n}{n!} e^{-at} f(t) \right)$.

(b) Démontrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} U_a^n(f)$ est simplement convergente sur I . On notera S sa somme.

On pourra utiliser sans démonstration : $\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^{+\infty} u^n e^{-u} du = n!$

(c) Démontrer qu'il existe un réel $b > 0$ tel que $S = U_b(f)$.

Partie 2

On admettra le théorème suivant :

Soient $u, v \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ telles que v est à valeurs positives et $\int_1^{+\infty} v(t) dt$ converge. Alors :

$$u = \underset{+\infty}{o}(v) \implies \int_x^{+\infty} u(t) dt = \underset{x \rightarrow +\infty}{o} \left(\int_x^{+\infty} v(t) dt \right)$$

- Soient f et g dans $\mathcal{E}$ avec g à valeurs positives et $f = \underset{+\infty}{o}(g)$. Montrer que $U_a(f) = \underset{+\infty}{o}(U_a(g))$.
- Soient f et g dans $\mathcal{E}$, g à valeurs positives telles que $f \underset{+\infty}{\sim} g$. Montrer que $U_a(f) \underset{+\infty}{\sim} U_a(g)$.
- Soit $f \in \mathcal{E}$ admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que $U_a(f)$ admet aussi une limite finie en $+\infty$.
On pourra commencer par étudier le cas où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
- Pour tout réel strictement positif ω , on note pour toute la suite du problème, h_ω la fonction de $\mathcal{E}$ qui à $t \in I$ associe $\frac{1}{t^\omega}$ et $H_\omega = U_a(h_\omega)$.
 - Montrer que l'on a pour tout $x \in I$: $H_\omega(x) = \frac{h_\omega(x)}{a} - \frac{\omega}{a} H_{\omega+1}(x)$.
 - En déduire que : $H_\omega(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{h_\omega(x)}{a}$.
- Montrer que pour tout $x \in I$: $\int_1^x \frac{e^{-at}}{t} dt = \ln x + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{a^k}{k \cdot k!} (x^k - 1)$.
 - En déduire que l'on a : $H_1(x) = e^{ax} \left(-\ln x - \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{a^k}{k \cdot k!} (x^k - 1) + \int_1^{+\infty} \frac{e^{-at}}{t} dt \right)$.

Partie 3

On reprend les fonctions f_r définies à la question 3.1 de la partie 1 avec maintenant $r > 0$.

- Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} U_a(f_r)(t) dt$ converge.
- Pour les fonctions h_ω définies à la question 4 de la partie 2, l'intégrale $\int_1^{+\infty} H_\omega(t) dt$ est-elle convergente ?
- Soit $f \in \mathcal{E}$, à valeurs positives et telle que $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge.
On note $\varphi : x \in I \mapsto \int_1^x f(t) dt$, $F = U_a(f)$ et $\Phi : x \in I \mapsto \int_1^x F(t) dt$.
 - Vérifier que l'on a pour tout $x \in I$: $\Phi'(x) - a\Phi(x) + \varphi(x) - F(1) = 0$.
 - Prouver que $\varphi \in \mathcal{E}$.
 - En déduire que l'intégrale $\int_1^{+\infty} F(t) dt$ converge.
- Soit $f \in \mathcal{E}$ intégrable sur I . Montrer que $U_a(f)$ est aussi intégrable sur I .